ORFENADRINA ION

Composición.
ORFENADRINA ION Comprimidos: Cada comprimido contiene Orfenadrina citrato 100 mg y excipientes c.s. Contiene lactosa.
ORFENADRINA ION Solución inyectable intramuscular: Cada ampolla de 2 mL contiene Orfenadrina citrato 60 mg y excipientes c.s.
Descripción.
Orfenadrina citrato es un antimuscarínico, con estructura de amina terciaria, de acción central con efectos analgésicos y anticolinérgicos. Tiene también propiedades anestésicas locales y antihistamínicas débiles.
Indicaciones.
ORFENADRINA ION está indicado como complemento del descanso, la terapia física y otras medidas para aliviar molestias asociadas a afecciones musculoesqueléticas agudas dolorosas.
Contraindicaciones.
Está contraindicado en pacientes con glaucoma, obstrucción pilórica o duodenal, úlceras pépticas, hipertrofia prostática u obstrucción del cuello vesical, cardioespasmo (megaesófago) y miastenia gravis.
Orfenadrina ION está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo.
Precauciones.
Algunos pacientes pueden experimentar episodios transitorios de aturdimiento, mareos o síncope.
La orfenadrina puede afectar la capacidad del paciente para participar en actividades potencialmente peligrosas como operar maquinaria o conducir vehículos.
Se han notificado casos de confusión, ansiedad y temblores en pocos pacientes que recibieron propoxifeno y orfenadrina de forma concomitante. Dado que estos síntomas pueden deberse simplemente a un efecto aditivo, se recomienda reducir la dosis y/o suspender uno o ambos agentes.
Debe utilizarse con precaución en pacientes con taquicardia, descompensación cardíaca, insuficiencia coronaria, arritmias cardíacas. No se ha establecido la seguridad de la terapia a largo plazo con orfenadrina. En caso de prescribirse para uso prolongado realizar monitoreo periódico de sangre, orina y función hepática.
No se ha establecido la seguridad para uso de orfenadrina en niños por lo que no se recomienda su uso.
ORFENADRINA ION solución inyectable contiene metabisulfito de sodio y puede llegar a provocar reacciones de tipo alérgico que incluyen síntomas anafilácticos y episodios asmáticos menores graves o potencialmente mortales en ciertas personas susceptibles.
Embarazo y lactancia: Catalogado como categoría C en el embarazo (potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio). Potencialmente riesgoso también durante la lactancia.
Efectos adversos.
La mayoría de los efectos adversos están asociados a las acciones farmacológicas antimuscarínicas, sobre todo a dosis altas. El efecto adverso más frecuente es sequedad bucal.
Cuando se aumenta la dosis diaria, los posibles efectos adversos incluyen: taquicardia, palpitaciones, vacilación, retención urinaria, visión borrosa, dilatación de las pupilas, aumento de la tensión ocular, debilidad, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos, estreñimiento, somnolencia, reacciones de hipersensibilidad, prurito, alucinaciones, agitación, temblor, irritación gástrica y rara vez urticaria y otras dermatosis. Con poca frecuencia, un paciente anciano puede experimentar cierto grado de confusión mental.
Por lo general, estas reacciones adversas pueden eliminarse mediante reducción de la dosis.
Se han producido casos muy raros de anemia aplásica asociada con el uso de orfenadrina. Se han observado casos raros de reacción anafiláctica.
Interacciones.
Los efectos antimuscarínicos pueden potenciarse con la administración concomitante de otros fármacos antimuscarínicos como la amantadita, algunos antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos y fenotiazínicos. Los fármacos simpaticomiméticos pueden contrarrestar los efectos.
Posología.
ORFENADRINA ION Comprimidos: La dosis usual es 1 comprimido cada 12 horas, o según prescripción médica.
La ranura del comprimido sirve únicamente para fraccionarlo y facilitar la deglución, pero no para dividirlo en dosis iguales.
ORFENADRINA ION Solución inyectable: La dosis usual es 1 ampolla por día, o según prescripción médica administrada por vía intramuscular.
Sobredosificación.
Pueden producirse síntomas como hipertermia, hipertensión, aumento de la frecuencia respiratoria, náuseas y vómitos.
En casos de sobredosificación masiva puede causar estimulación del SNC manifestada por inquietud, confusión, excitación y ataxia. En casos graves puede conducir a depresión del SNC, insuficiencia respiratoria y coma.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, comunicarse con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), tel. 1722.
Presentaciones.
ORFENADRINA ION Comprimidos: Envase x 10 y x 20 comprimidos. Envase mutual x 1000 comprimidos.
ORFENADRINA ION Solución inyectable: Envase x 100 ampollas.
Conservación.
Conservar a temperatura ambiente (15-30)ºC en su envase original.

3951-042021

LABORATORIO ION S.A.
Paysandú 1023 - Montevideo
Industria Uruguaya
www.laboratorioion.com

3168