CEFALEXINA ION

3946-102015

Composición:
CEFALEXINA ION 250 suspensión. Polvo para preparar 60 mL de suspensión: Cada 5 mL de suspensión reconstituida contiene 250 mg de Cefalexina (como monohidrato). Contiene parabenos.
CEFALEXINA ION 250 comprimidos revestidos: Cada comprimido contiene 250 mg de Cefalexina (como monohidrato) y excipientes c.s.
CEFALEXINA ION 500 comprimidos revestidos: Cada comprimido contiene 500 mg de Cefalexina (como monohidrato) y excipientes c.s.

Descripción.
CEFALEXINA ION es una cefalosporina de primera generación de origen semi sintético. Sólo se encuentra disponible para administración por vía oral.

Indicaciones.
CEFALEXINA está indicada como tratamiento de segunda elección en pacientes alérgicos a penicilinas, infecciones causadas por microor ganismos sensibles y enfermedades en las que han fallado otros tratamientos como: infecciones en pacientes con fibrosis quística; profilaxis para intervenciones dentales; osteomielitis debida a Staphylococcus aureus resistente a penicilina, o Proteus mirabilis; otitis media causada por Streptococcus pneumoniae u otros Streptococcus sensibles, Haemophilus influenzae, Staphylococcus sp y Neisseria catarrhalis; peritonitis; faringitis estreptocócica; infecciones prostáticas y profilaxis en prostatectomía; infecciones respiratorias bajas causadas por Streptococcus pneumoniae y pyogenes, sinusitis; infecciones de piel y tejidos blandos; infecciones de vías urinarias causadas por E. coli, Proteus y Klebsiella.

Espectro de acción.
CEFALEXINA presenta un espectro de acción reducido. Incluye a la mayoría de las bacterias Gram positivas, incluyendo estreptococos y estafilococos productores de peni cilinasa. Su actividad en contra de bacterias Gram negativas está restringida prácticamente a E. coli, Klebsiella y Proteus mirabilis. Los organismos mencionados a continuación son organismos resistentes, por lo que no debe emplearse CEFALEXINA: Enterococos, estafilococos meticilino-resistentes, Citrobacter, Enterobacter, Listeria monocytogenes, Proteus diferentes a mirabilis, Providencia, Serratia, Bacteroides fragilis y Pseudomonas, H. influenzae.

Contraindicaciones.
Hipersensibilidad al principio activo o alguno de sus componentes o en pacientes con antecedente de reacciones alérgicas a cefalosporinas. Puede existir reacción alérgica cruzada entre CEFALEXINA y las penicilinas, por lo que se debe tener precaución en pacientes con antecedentes de alergia a la penicilina.

Precauciones.
Es importante vigilar la integridad del tracto gastrointestinal y el funcionamiento apropiado del sistema renal.
Embarazo y Lactancia: Solamente se debe administrar durante el embarazo si es claramente necesario. Se debe administrar con precaución en períodos de lactancia ya que la Cefalexina se excreta en la leche.

Reacciones adversas.
Hematológicas: En algunos pacientes que están recibiendo CEFALEXINA se ha reportado: neutropenia, eosinofilia y anemia hemolítica inmune.
Sistema nervioso central: En raras ocasiones se ha observado neurotoxicidad. Ésta se caracteriza por diplopía, cefalea y marcha inestable. Con dosis altas de CEFALEXINA se han reportado convulsiones y alteraciones psicóticas.
Gastrointestinales: En este sistema se presentan los efectos adversos más frecuentes de CEFALEXINA: diarrea, náusea, vómito y dolor abdominal. En algunas ocasiones se ha reportado prurito anal y genital. CEFALEXINA puede inducir colitis seudo membranosa por superinfección, debido a Clostridium difficile.
La suspensión del tratamiento, más las medidas adecuadas de soporte, revierten este efecto.
CEFALEXINA puede elevar las cifras de as partato-amino transferasa y alanina-aminotransferasa.
Riñón y aparato genitourinario: cuadros de vaginitis, prurito genital y anal, moniliasis vaginal y vulvovaginitis. Si bien es rara, CEFA LEXINA puede inducir nefrotoxicidad, en especial en pacientes con terapias prolongadas.
Piel: erupción, en especial en pacientes con cuadros activos de mononucleosis infecciosa, urticaria y dermatitis con el uso de CEFALEXINA.
En algunos casos han desencadenado cuadros de pénfigo vulgar.
Otros efectos indeseables observados con CEFALEXINA incluyen: Síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, fiebre medicamentosa, tinnitus y enfermedad del suero, aunque son poco frecuentes.

Interacciones.
La asociación de CEFALEXINA con cefalosporinas en general y con aminoglucósidos puede resultar en nefro toxicidad grave.
La asociación con colestiramina puede disminuir la absorción de CEFALEXINA.
Los alimentos también disminuyen la absorción de este antibiótico.

Posología y administración.
Dosis usual niños: 25 - 50 mg/kg día cada 6 horas.
Adultos: 250 - 500 mg cada 6 horas
Preparación de la suspensión: Agregar agua hasta la marca indicada, tapar, agitar y luego completar nuevamente hasta alcanzar el nivel de la marca indicada en el envase. Luego de preparada la suspensión, la misma puede conservarse hasta 7 días a temperatura ambiente.

Sobredosificación.
No existe un antídoto específico para la sobredosis de CEFALEXINA; en caso de que ocurra, se deben aplicar las medidas de apoyo tradicionales, y utilizar tanto diálisis peritoneal como hemodiálisis para disminuir los niveles plasmáticos del medicamento.
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con el 1722 CIAT, Centro de Atención y Asesoramiento Toxicológico.

Presentaciones.
CEFALEXINA ION 250 suspensión. Frasco conteniendo polvo para preparar 60 mL de suspensión. Envase mutual x 50 frascos.
CEFALEXINA ION 250 comprimidos: Envase x 16 comprimidos.
CEFALEXINA ION 500 comprimidos: Envase x 16 comprimidos. Envase mutual x 160 comprimidos.

Conservación.
Conservar a temperatura ambiente (15-30)ºC en su envase original.

Laboratorio ION
LABORATORIO ION S.A.
Paysandú 1023 - Montevideo
Industria Uruguaya
www.laboratorioion.com

2-301015