DICLOFENAC ION OFTÁLMICO

Composición.
DICLOFENAC ION OFTÁLMICO: Cada 100 mL de solución contiene 0.1 g de Diclofenac sódico y excipientes c.s.

Descripción.
Antiinflamatorio-analgésico no esteroideo para aplicación tópica oftálmica.

Indicaciones.
Inflamaciones post-traumáticas en el caso de heridas penetrantes y no penetrantes, en combinación con un tratamiento local antiinfeccioso.
Tratamiento de la inflamación postoperatoria como cataratas u otras intervenciones quirúrgicas.
Tratamiento de conjuntivitis, queratoconjuntivitis, úlceras de cornea e inflamación post-traumática de la cornea y conjuntiva, siempre que no se asocien a una infección ocular.
Profilaxis pre y postoperatoria del edema macular cistoide en relación con la extracción de cataratas e implantación intraocular de lentes y alivio del dolor y la fotofobia en pacientes sometidos a cirugía refractiva corneal.

Contraindicaciones.
DICLOFENAC ION OFTÁLMICO no debe ser administrado a aquellas personas que tengan hipersensibilidad al diclofenac o a alguno de los excipientes.

Precauciones.
Se recomienda usar DICLOFENAC ION OFTÁLMICO con precaución en pacientes quirúrgicos, con conocimiento de tendencias de sangrado o que están usando algún otro medicamento que prolongue el tiempo de sangrado.
Los pacientes que presenten visión borrosa después de la aplicación de DICLOFENAC ION OFTÁLMICO deben prescindir de manejar automóviles o maquinarias.
Existe una sensibilidad cruzada potencial al ácido acetil salicílico, los derivados del ácido fenilacético y otros agentes antiinflamatorios no esteroideos, por lo que deberá tenerse precaución en personas con antecedentes de hipersensibilidad a estos medicamentos.
El diclofenac, al igual que todos los antiinflamatorios no esteroideos, podría retardar el proceso de cicatrización. El uso concomitante con esteroides tópicos podría incrementar los problemas potenciales de cicatrización.
En caso de usar lentes de contacto, se deben retirar antes de administrar.
Evítese tocar la punta del gotero, y mantenga el envase bien cerrado.

Efectos adversos.
En algunos casos se han observado los siguientes efectos adversos: Ardor ligero o agudo por corto tiempo, visión borrosa, reacciones extra sensibles con prurito, enrojecimiento y sensibilidad a la luz, así como también alteraciones en la producción de lágrimas y alergia ocular.
Las reacciones adversas a nivel sistémico son mínimas dado las escasas concentraciones plasmáticas de dicho fármaco halladas luego de la aplicación tópica oftálmica. Éstas incluyen: Dolor abdominal, astenia, escalofríos, mareo, edema facial, náuseas, dolor, rinitis y vómitos.

Interacciones.
Los antiinflamatorios no esteroideos de uso oftálmico pueden interferir con la acción de cualquier medicamento que altere el tiempo de sangrado o la coagulación como: Anticoagulantes, cumarina o derivados de la indandiona o heparina.
Con la finalidad de evitar que la sustancia activa sea eliminada, en caso de requerirse otro producto oftálmico, se recomienda esperar al menos 5 minutos entre una y otra aplicación.

Posología.
Adultos: Para el tratamiento de conjuntivitis, queratoconjuntivitis, úlcera de la cornea o inflamación postraumática, se recomienda instilar 1 gota en el ojo, de 4 a 5 veces por día, durante un período no mayor a 2 semanas.
Para el tratamiento posterior a la cirugía de cataratas, instilar 1 gota en el ojo afectado 4 veces al día, 24 horas después de la operación y en forma diaria, durante un período máximo de 2 semanas.
Para la prevención o reducción de miosis intra-operativa y post-operativa se recomienda instilar una gota en el ojo afectado 5 veces durante 3 horas previo a la cirugía, luego a los 15, 30 y 45 minutos después a la cirugía. Posteriormente de 3 a 5 gotas por día por el tiempo que resulte necesario, procurando no exceder el período de 2 semanas.
Niños: Hasta el momento no se dispone de datos de experiencias realizadas en niños.

Sobredosificación.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, comunicarse con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), tel. 1722.

Presentaciones.
DICLOFENAC ION OFTÁLMICO: Envase x 1 frasco gotero de 5 mL.

Conservación.
Conservar a temperatura ambiente (15-30)ºC en su envase original.

2375-102014

LABORATORIO ION S.A.
Paysandú 1023 - Montevideo
Industria Uruguaya
www.laboratorioion.com

1-251115