NOVOALGION
DIPIRONA

Composición.
NOVOALGION PEDIÁTRICO:
Cada 100 mL de solución contiene 8 g de Dipirona, excipientes c.s. (Contiene sacarina sódica y ciclamato de sodio y parabenos como conservadores).
NOVOALGION Comprimidos:
Cada comprimido contiene 500 mg de Dipirona, excipientes c.s
NOVOALGION Solución inyectable:
Cada ampolla de 2 mL contiene 1 g de Dipirona.

Descripción.
Dipirona es un derivado pirazolónico, que posee una acción analgésica completa sin hipnosis, efecto antiinflamatorio y potente efecto antipirético, con leve acción como relajante muscular. Actúa sobre los centros corticales del dolor elevando el umbral de percepción de sensaciones dolorosas produciendo una analgesia completa, seguida de tranquilización sin hipnosis. Tiene acción sobre cualquier tipo de dolor visceral, cutáneo o profundo.
Posee además acción espasmolítica sobre diferentes vísceras sin alterar su función normal; así produce una reducción de la contractura muscular lisa del intestino sin alterar el peristaltismo.

Indicaciones.
- Dolor agudo postoperatorio o post-traumático.
- Dolor de tipo cólico.
- Dolor oncológico.
- Dolor ginecológico: Dismenorrea.
- Dolor odontológico: Gingivitis.
- Fiebre alta que no responde a otros antipiréticos.

Contraindicaciones.
Pacientes con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad a dipirona u otros derivados pirazolónicos. Pacientes que han presentado broncoespasmo u otras reacciones anafilácticas después de la administración de analgésicos tales como salicilatos, paracetamol u otros analgésicos. Pacientes con porfiria hepática intermitente aguda o con déficit congénito de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa. Pacientes con alteraciones de la función de la médula ósea o trastornos del sistema hematopoyético. Tercer trimestre del embarazo. Niños menores de tres meses o de peso corporal inferior a 5 Kg.
No administrar por vía intravenosa a niños menores de un año.

Precauciones.
El tratamiento será interrumpido de forma inmediata si aparece algún signo o síntoma sugestivo de anafilaxis/shock anafiláctico (disnea, asma, rinitis, edema angioneurótico o de glotis, hipotensión, urticaria, rash) o agranulocitosis (fiebre alta, escalofríos, dolor de garganta, inflamación en boca, nariz o garganta, lesiones en mucosa oral o genital).
Los pacientes que hayan experimentado una reacción de hipersensibilidad a dipirona, no deben volver a ser expuestos a dicho activo.
Se debe prestar especial atención en pacientes con historia de alergias múltiples a medicamentos, especialmente a salicilatos.
En tratamientos prolongados se debe realizar control hemocitológico.

Embarazo y lactancia: En embarazo, catalogado categoría C de la FDA, potencialmente riesgosa; evaluar riesgo/beneficio.
No se dispone de información sobre los niveles de dipirona en leche humana después de su administración, por lo tanto se recomienda utilizar solamente cuando la valoración riesgo/beneficio lo aconseje.

Efectos adversos.
El tratamiento con NOVOALGION conlleva un riesgo aumentado de reacciones anafilácticas y agranulocitosis. Ambas reacciones pueden aparecer en cualquier momento después de iniciado el tratamiento y no muestran relación con la dosis diaria administrada. El riesgo de aparición de un shock anafiláctico parece ser mayor con las formas parenterales.

Interacciones.
Potencia y se potencia con otros derivados pirazolónicos.
Potencia, a dosis altas, los efectos de algunos depresores del SNC.
Con fenilbutazona y barbitúricos, hay una reducción mutua de sus acciones.
Dipirona disminuye el filtrado renal de salicilato y eleva los niveles en sangre, pudiendo aparecer una reacción alérgica.
Dipirona puede potenciar la acción de los anticoagulantes cumarínicos y disminuir las concentraciones plasmáticas de ciclosporina.

Posología.
NOVOALGION PEDIÁTRICO: Dosis usual para niños de 20 Kg: ½ cucharita (2,5 mL de solución) cada 8 horas y para niños de 40 Kg: 1 cucharita (5 mL de solución) cada 8 horas.
Como referencia, por vía oral en niños se administran 10 mg de dipirona por Kg de peso corporal, cada 8 horas.
Dosis usual adultos: 1 a 3 cucharitas (5 a 15 mL) cada 8 horas.
NOVOALGION Comprimidos: Dosis habitual en adultos es de 0.5 a 1 g cada 6 u 8 horas.
NOVOALGION Solución inyectable: Por vía intramuscular o intravenosa, una ampolla cada 12 a 24 horas.
Las dosis no deben superar los 4 g diarios.

Sobredosificación.
Podría llegar a presentarse a dosis muy superiores, originando un cuadro de vómitos, depresión del SNC, hipotermia e hipotensión. El tratamiento se realizará con medidas de índole general; diuresis forzada y analépticos. En caso de sobredosificación podría aparecer un cuadro de agranulocitosis. El tratamiento primordial consiste en administrar antibiótico, ya que puede existir peligro de infección.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, comunicarse con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), tel. 1722.

Presentaciones.
NOVOALGION PEDIATRICO: Envase x 1 frasco de 50 mL y x 1 frasco de 100 mL. Envase mutual x 50 frascos de 50 mL.
NOVOALGION Comprimidos: Envase x 10 comprimidos. Envase mutual x 200 comprimidos.
NOVOALGION Solución inyectable: Envase x 100 ampollas.

Conservación.
Conservar a temperatura ambiente (15-30)ºC en su envase original.

2388-102015

LABORATORIO ION S.A.
Paysandú 1023 - Montevideo
Industria Uruguaya
www.laboratorioion.com

4-180216